

# Info | Médicament

Votre médecin vous a prescrit un médicament contre l'ostéoporose :

**Acide risédronique 35 mg**

Ce médicament appartient à la famille des bisphosphonates.

C'est la famille de référence des médicaments contre l'ostéoporose.

## Comment agit ce médicament ?

Il s'agit d'un médicament anti-résorptif, c'est-à-dire qu'il diminue la résorption de l'os, afin de lutter contre la perte osseuse à l'origine de l'ostéoporose.

## Quels sont les effets secondaires possibles ?

Comme tout médicament ayant un effet positif, des effets secondaires peuvent survenir.

Ce sont le plus souvent des effets secondaires bénins :

- troubles digestifs banals : douleurs abdominales, nausées, vomissements, constipation ou diarrhée, régurgitations acides ;
- douleurs au niveau des os, des muscles ou de la tête ;
- diminution modérée et transitoire du calcium dans le sang, ne donnant lieu à aucun symptôme.

Certains effets secondaires graves peuvent survenir de façon exceptionnelle :

- **ulcération de l'œsophage** (irritation de l'œsophage) : le respect des conditions de prises de votre médicament permet de diminuer au maximum ce risque ; ces conditions de prises sont détaillées dans le paragraphe suivant ;
- **ostéonécrose de la mâchoire** (lésion de l'os de la mâchoire) : le respect des règles habituelles d'hygiène bucco-dentaire, ainsi qu'un suivi par un dentiste au moindre symptôme bucco-dentaire (douleur ou gonflement dans la bouche, mobilité d'une dent, etc.) et au minimum 1 fois par an, permettent de diminuer au maximum ce risque ;
- **fracture atypique du fémur** : consulter votre médecin en cas de douleur, de faiblesse ou gêne dans la cuisse, la hanche ou l'aîne.

## Comment prendre ce médicament ?

Les conditions de prises de votre médicament sont à respecter scrupuleusement car sa bonne efficacité et sa bonne tolérance en dépendent.

1. **Votre médicament doit être pris 1 fois par semaine** : le même jour de la semaine, chaque semaine.
2. **Votre médicament doit être pris avec un estomac vide pour faciliter son absorption** :
  - ⇒ le matin à jeun ;
  - ⇒ attendre au moins 30 minutes avant de manger ou boire autre chose.

3. **Votre médicament doit être pris selon certaines règles strictes afin de faciliter son passage dans l'estomac et éviter une irritation de l'œsophage** (qui relie votre gorge à l'estomac) :
- ⇒ assis ou debout ;
  - ⇒ avaler le comprimé en entier, sans croquer, ni laisser fondre dans la bouche ;
  - ⇒ avec un grand verre d'eau du robinet ;
  - ⇒ sans se recoucher ou se pencher en avant pendant les 30 minutes qui suivent, et jusqu'au petit déjeuner.
4. **En cas d'oubli d'une prise**, prenez 1 comprimé le matin où vous vous en apercevez puis revenez au jour de prise habituel ; **ne prenez pas 2 comprimés le même jour.**

### **Pourquoi ce médicament plutôt qu'un autre ?**

**Il n'y a pas d'études comparant directement les médicaments contre l'ostéoporose entre eux.** Ils ont globalement une efficacité similaire sur la prévention des fractures vertébrales (diminution de moitié) et certains médicaments diminuent également le risque des autres fractures ostéoporotiques, notamment le risque de fracture de la hanche.  
**Cette efficacité est surtout prouvée chez la femme ménopausée qui a déjà fait une fracture ostéoporotique.**

Le choix du médicament contre l'ostéoporose dépend de votre risque de fracture, de certains de vos antécédents médicaux qui peuvent contre-indiquer ou au contraire faire préférer certains médicaments, et aussi de vos préférences, notamment en ce qui concerne les modalités de prise.

### **Comment savoir si ce médicament est efficace ?**

**L'objectif du traitement contre l'ostéoporose est d'éviter la survenue de fractures.**  
**Il n'existe pas actuellement de marqueurs fiables pour évaluer l'efficacité des médicaments contre l'ostéoporose.** Certaines prises de sang permettent, dans certaines conditions précises, d'avoir un aperçu de cette efficacité. Mais ces tests ne sont pas suffisamment fiables pour être recommandés en pratique courante.

**Votre traitement ne sera efficace que s'il est pris régulièrement.**

Votre médecin peut donc être amené à vérifier avec vous votre prise du médicament et à vous demander si avec difficultés à le prendre, afin de trouver une solution.

**Si une fracture survient alors que vous prenez un traitement contre l'ostéoporose depuis plus d'un an**, on peut penser que votre médicament n'est pas suffisamment efficace. Votre médecin peut alors être amené à vous proposer un autre médicament contre l'ostéoporose.

### **Pendant combien de temps dois-je prendre ce médicament ?**

**Tout médicament contre l'ostéoporose n'est efficace que s'il est pris pendant plusieurs années.**  
**Le plus souvent, au bout de 5 ans de traitement**, votre médecin réévalue votre risque de fracture, ce qui lui permet de juger de la nécessité ou non de continuer un médicament contre l'ostéoporose. Si l'indication d'un médicament contre l'ostéoporose est toujours présente, alors votre médecin peut vous prescrire le même, ou un autre médicament, pour une nouvelle « séquence » de 5 ans.

**Dans tous les cas, toutes les autres mesures de prévention des fractures (apports suffisants en calcium et en vitamine D, activité physique régulière etc.) doivent être maintenues à vie.**